

AVC PODE ACONTECER EM QUALQUER IDADE

O DIAGNÓSTICO PRECOCE DO AVC NA CRIANÇA É MUITO IMPORTANTE



AVC NA INFÂNCIA

1 MÊS DE VIDA AOS 18 ANOS

Fatores de risco em crianças são diferentes de fatores de risco em adultos

Sinais de alerta:

- Fraqueza ou dormência em um lado do corpo;
- Dificuldade de falar;
- Alteração na visão;
- Tonturas ou perda de coordenação;
- Convulsões;
- Preferência do uso de uma das mãos antes de um ano de vida;
- Dor de cabeça súbita, especialmente com vômitos e sonolência.

Riscos em crianças incluem:

- Doença cardíaca congênita;
- Doenças que afetam as artérias do cérebro;
- Infecções do cérebro ou outros órgãos;
- Traumatismo craniano;
- Doença falciforme;
- Doenças auto imunes.



AVC PERINATAL

ÚLTIMOS MESES DE GESTAÇÃO ATÉ 1 MÊS DE VIDA

Fatores de risco:

- Complicações na gestação;
- Doença cardíaca congênita;
- Distúrbios da placenta;
- Distúrbios de coagulação no sangue;
- Infecções.

Sinais de alerta:

- Convulsões;
- Espasmos repetitivos da face, braço ou perna;
- Apneia (*pausas na respiração*) e olhar arregalado.



World Stroke
Organization

©2015 World Stroke Organization

Não demore!

Diagnóstico imediato e tratamento de AVC em crianças é tão urgente quanto em adultos



SOCIEDADE
BRASILEIRA
DE DOENÇAS
CEREBROVASCULARES



Ministério da
Saúde

